

相机行事
具有信心
具有好奇心
百折不挠
支持鼓励
做自己
富有创造性
愿意尝试

卡博替尼 (CABOMETYX) 伴您同行

并非实际的患者

供患者及其护理者使用的卡博替尼手册



请参阅散见于本文全文的“重要安全信息”，
并[点击此处](#)参阅“处方信息”全文中的“患者信息”。

目录

本手册包含哪些内容	3
关于卡博替尼	4
卡博替尼如何发挥作用	4
可能的副作用	5-8
应对副作用	9
剂量	10-11
财务协助	12
词汇表	13
要问您肿瘤科医生的问题	14

您能从这本手册中找到什么

本手册有助于解答您可能提出的卡博替尼治疗方面的一些问题。

本手册讨论的话题包括：

- 什么是卡博替尼以及它如何发挥作用
- 如何服用卡博替尼以及为什么您的剂量会变化
- 财务和支持信息

请注意，斜体词汇已列入第13页的词汇表中。

如果您在寻找更多信息，请访问网站：



www.cabometryx.com

**如果您有任何问题，请和您的肿瘤科医生或护士讨论。
他们永远是您最好的健康资源。**

请参阅散见于本文全文的“重要安全信息”，并点击[此处](#)参阅“处方信息”全文中的“患者信息”。

 **CABOMETRYX[®]**
(cabozantinib) tablets

1

什么是卡博替尼?

卡博替尼是:

- 一种药片
- 一种处方药, 用来治疗:
 - 晚期肾癌 (肾细胞癌) 患者
 - 之前曾用索拉非尼 (sorafenib) 药物治疗的肝癌 (肝细胞癌) 患者

尚不清楚卡博替尼对儿童是否安全有效。


2

卡博替尼如何发挥作用?

所有细胞都会发出信号, 告诉细胞何时生长、分裂或者死亡。与正常细胞不同, 癌细胞不会如期停止生长并分裂。

这种生长失控会导致**肿瘤**形成。

卡博替尼被认为能通过阻断某些“生长/分裂”信号发挥作用, 导致细胞死亡。卡博替尼对正常细胞和癌细胞可能都有影响。它还被认为能帮助阻止滋养癌细胞的血管生长。癌细胞死亡时, **肿瘤很有可能**停止生长, 甚至可能萎缩。






3

卡博替尼可能会产生哪些副作用?

下面列出您应当知道的一些“重要安全信息”

卡博替尼可能会产生严重的副作用, 包括:

-  **流血 (出血)**。卡博替尼可引发严重出血, 可能造成死亡。使用卡博替尼治疗期间, 如果您有任何出血迹象, 请立即告诉您的医疗保健服务提供者, 包括:
 - 咳血或血块
 - 吐血或您的呕吐物看起来像咖啡渣
 - 大便呈红色或黑色 (看起来像焦油)
 - 月经出血量比平时多
 - 任何异常出血或大量出血
-  **胃壁或肠壁撕裂 (穿孔) 或身体两部分之间的异常连接 (瘘管)**。如果您的胃部 (腹部) 有压痛或疼痛, 请立即告诉您的医疗保健服务提供者。
-  **血块、中风、心脏病和胸痛**。如果您有以下情况, 请立即寻求急救:
 - 手臂或腿部肿胀或疼痛
 - 呼吸急促
 - 感到头昏眼花或晕眩
 - 汗比平常出得多
 - 面部、手臂或腿部麻木或无力, 尤其是您身体的一侧
 - 突然犯迷糊、说话或理解有困难
 - 一只或两只眼睛突然难以看清
 - 突然感觉走路困难
 - 头晕、失去平衡或不协调
 - 突然剧烈头痛

重要安全信息 (续)



血压高 (高血压)。高血压是卡博替尼的常见副作用,有时可能会很严重。开始用卡博替尼之前,以及在用卡博替尼治疗期间,您的医疗保健服务提供者会给您量血压。如果有需要,您的医疗保健服务提供者可能会给您开药,治疗您的高血压。



腹泻。腹泻是卡博替尼的常见副作用,可能会很严重。如果有需要,您的医疗保健服务提供者可能会给您开药,治疗您的腹泻。如果您经常排稀便、拉稀,请立即告诉您的医疗保健服务提供者。



一种被称为手足皮肤反应的皮肤问题。手足皮肤反应是常见的副作用,可能会很严重。如果您的手掌或脚底有皮疹、泛红、疼痛、肿胀或水泡,请立即告诉您的医疗保健服务提供者。



您尿液中有蛋白质和可能的肾脏问题。症状可包括您的手、手臂、腿或脚肿胀。



严重的颌骨问题 (骨坏死)。症状可包括下巴疼痛、牙痛或牙龈溃疡。在您开始用卡博替尼之前和治疗期间,您的医疗保健服务提供者应检查您的口腔。告诉您的牙医您在服用卡博替尼。用卡博替尼治疗期间,采取良好的口腔护理措施对您很重要。



伤口愈合问题。有些服用卡博替尼的人已出现伤口愈合问题。如果您打算在使用卡博替尼治疗之前或期间做任何外科手术,请告诉您的医疗保健服务提供者。

- 在按计划做外科手术之前,您应当至少提前3个星期停止服用卡博替尼。
- 您的医疗保健服务提供者应告诉您术后多久可以重新开始服用卡博替尼。



可逆后脑白质病变综合征 (Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome, RPLS)。用卡博替尼治疗期间,可能会发生一种被称为可逆后脑白质病变综合征的情况。如果您有头痛、癫痫、迷糊、视力改变或思维困难问题,请立即告诉您的医疗保健服务提供者。



卡博替尼可引发女性和男性的生育问题,这可能会影响您生儿育女的能力。如果您担心生育问题,请和您的医疗保健服务提供者讨论。



如果您出现某些副作用,您的医疗保健服务提供者可能会更改您的剂量、暂时或永久性停止使用卡博替尼治疗。

卡博替尼最常见的副作用包括:

- 疲劳
- 食欲减退
- 体重减轻
- 恶心
- 呕吐
- 某些血液测试结果发生变化

如果副作用对您造成困扰或症状没有消失,请告诉您的医疗保健服务提供者。这些并非卡博替尼可能造成的全部副作用。



请打电话给您的医生,获取有关副作用的医疗建议。您可拨打 1-800-FDA-1088 向食品及药物管理局 (FDA) 报告副作用。



在服用卡博替尼之前,请将您的全部医疗状况告诉您的医疗保健服务提供者,其中包括您:

- 最近有不寻常出血史,包括咯血或吐血,或黑色焦油状大便。
- 有开放性或正在愈合的伤口。
- 有高血压。
- 打算做任何外科手术、牙科手术,或近期曾做过外科手术。在按计划做外科手术之前,您应当至少提前3个星期停止卡博替尼治疗。

重要安全信息 (续)

- 已怀孕或计划要怀孕。卡博替尼可能会伤害您尚未出生的宝宝。
 - 如果您能怀孕，您的医疗保健服务提供者可能会在您开始用卡博替尼治疗之前检查您是否怀孕。
 - 能够怀孕的女性在用卡博替尼治疗期间以及最后一剂卡博替尼用完之后4个月之内应采用有效的生育控制（避孕）措施。
 - 请和您的医疗保健服务提供者讨论可能适合您的生育控制措施。
 - 如果您怀孕了或认为自己怀孕了，请立即告诉您的医疗保健服务提供者。
- 正在哺乳或计划要哺乳。尚不清楚卡博替尼会不会进入您的母乳。在用卡博替尼治疗期间以及最后一剂卡博替尼用完之后4个月之内不要哺乳。

将您服用的所有药物告诉您的医疗保健服务提供者，包括处方药或非处方药、维生素和草药补充剂。卡博替尼和其它某些药物可能会互相影响，从而造成副作用。

服用卡博替尼期间我应当避免什么？使用卡博替尼治疗期间，不要喝葡萄柚汁、吃葡萄柚或服用含有葡萄柚或金丝桃的补充剂。

4

副作用能不能控制？

曾发现服用卡博替尼的人出现副作用。如果您出现困扰您的副作用或副作用没有消失，请立即告诉您的肿瘤科医生或护士。他们越早了解您的副作用，越能尽早帮您控制副作用，如果有可能控制的话。

剂量调整可用来控制某些副作用，例如：



腹泻



疲劳（非常累和/或感觉就像您没有精力一样）



口疮



手口皮肤反反应



恶心（感觉像您就要吐了）
或呕吐



高血压（血压高）

一旦出现任何副作用请立即说出来。如果您出现某些副作用，您的肿瘤科医生可能要调整您的剂量，找出适合您的卡博替尼剂量。

请查看第11页“您的剂量会不会变？”，
了解有关剂量调整的更多信息。

除了剂量调整，还有一些方法有助于控制某些副作用。您的肿瘤科医生或护士可能会建议您改变生活方式以及服用其它有用的药物。



如果您需要更多信息，帮助应对某些副作用的建议，
网站 www.cabometryx.com 上有

或者



查看您患者护理包内有关副作用管理方法的卡片

5

您应当如何服用卡博替尼?

卡博替尼是一种药片, 您每天服用一次。



不要和食物一起服用卡博替尼

吃东西前至少一小时或吃东西后至少2小时才能服用卡博替尼



用8盎司水吞服整片药

请勿碾碎药片

所示药片并非实际尺寸。



使用卡博替尼治疗期间, **不要**喝葡萄柚汁、吃葡萄柚或服用含有葡萄柚或金丝桃的补充剂。

6

忘了服用卡博替尼怎么办?

如果您忘了服用卡博替尼, 并且您的下一剂药应在

不到12个小时内服用

- 不要试图补上漏服的剂量
- 按平常的时间服用下一剂

12个小时或之后服用

- 尽快补上漏服的剂量
- 按平常的时间服用下一剂



如果您过量服用卡博替尼, 请立即打电话给您的医疗保健服务提供者。

请参阅散见于本文全文的“重要安全信息”, 并[点击此处](#)参阅“处方信息”全文中的“患者信息”。

7

您的卡博替尼剂量会不会变?

如果您出现某些副作用, 您的**肿瘤科医生**或**护士**可能会调整您的剂量。他们可能会:



让您暂停服用卡博替尼一段时间

或者



减少您的卡博替尼剂量

暂停服用或减少卡博替尼剂量并不少见。许多参加卡博替尼**临床试验**的人都有在暂停服用或减少剂量的情况, 以帮助他们控制某些副作用。

有时, 您的医生可能会停止给您治疗, 视您的副作用情况而定。

请务必按照您**肿瘤科医生**的建议服用药物。

卡博替尼有3种不同的剂量



60 毫克



40 毫克



20 毫克

所示药片并非实际尺寸。

每个服用卡博替尼的人的反应都不同。您和您的**肿瘤科医生**应根据您身体对卡博替尼的反应来确定适合您的剂量。



帮助获得。提供协助。一路相伴。

EXELIXIS便利服务 (Exelixis Access Services, EASE) 是您的资源, 可解答您关于卡博替尼的承保、财务协助和治疗支持方面的问题并满足您的相关需求。

要进一步了解EASE可在哪些方面帮您, 请和我们联系:



电话: 1-844-900-EASE
(1-844-900-3273)



美国东部时间星期一至星期五上午8点到晚上8点

向您提供个性化支持

训练有素的专业人员通过电话帮您:

- 了解您的健康保险是否承保卡博替尼和您与卡博替尼相关的自付费用是多少
- 了解您能选择哪些财务支持

如果您有商业保险……



EASE共付额计划

有商业保险的合格患者每月为卡博替尼支付0美元。这项计划承保自付药费, 最高为每年25,000美元。有政府保险的患者不包括在内。还有其它限制和资格规定。

如果您没有保险, 或有保险但还是负担不起药费……



EASE患者协助计划

如果您符合资格, EASE患者协助计划可向您提供免费的卡博替尼。可能还有其它限制和资格规定。

本Exelixis便利服务(Exelixis Access Services®)计划说明仅用于提供信息。Exelixis对任何服务或项目的报销或承保不做任何声明或保证。通过本Exelixis便利服务计划提供的信息不构成医疗或法律意见, 也无意取代持照医疗保健服务提供者、法律顾问或适用的第三方支付人提供的咨询意见。Exelixis保留随时修改本计划的权利, 无须另行通知。

词汇表

临床试验: 旨在测试新医疗方法的研究, 例如新药物以及它们在人体内如何发挥作用。

肿瘤科医生: 诊断和治疗癌症的医师。对于任何与卡博替尼相关的问题, 该人士是主要联系人。他/她也可以协调其他专科医生提供的治疗。

肿瘤: 一种不正常的细胞团块, 它的产生是因为细胞生长和分裂的速度比正常情况下要快, 而且不会像在正常情况下那样死亡。肿瘤可以是癌, 也可以是良性的(非癌变)。

请参阅散见于本文全文的“重要安全信息”, 并[点击此处参阅“处方信息”全文中的“患者信息”](#)。



在 WWW.CABOMETRYX.COM
了解更多信息

请参阅散见于本文全文的“重要安全信息”，
并点击此处参阅“处方信息”全文中的“患者信息”。

