



# SU DIARIO DEL TRATAMIENTO

le ayuda a llevar un registro de cómo se siente durante el tratamiento con CABOMETRYX® (cabozantinib)

Representación de un paciente

- Para personas que toman CABOMETRYX en combinación con OPDIVO® (nivolumab)
- Para personas que toman CABOMETRYX solo

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

 **CABOMETRYX**®  
(cabozantinib) tablets

## Lleve un registro de cómo se siente

Este Diario del Tratamiento lo ayudará mientras tome CABOMETRYX® (cabozantinib) solo o en combinación con OPDIVO® (nivolumab).

### Su médico o enfermera están disponibles para ayudarlo.

Ellos son el mejor recurso para obtener información sobre su tratamiento.

- Coménteles si experimenta algún síntoma de efectos secundarios. El equipo de atención médica está disponible para ayudarlo a manejar efectos secundarios
- Cuanto antes les comunique sus síntomas, antes recibirá apoyo

### Asegúrese de tomar la dosis que recomienda su médico



Llame a su médico o enfermera de inmediato si no se siente bien.

La información en este diario no sustituye el asesoramiento de su equipo de atención médica.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

Para ayudarlo a trabajar junto a su equipo de atención médica para manejar ciertos efectos secundarios, tenemos un enfoque llamado RIM.



### RECONOCER

si se siente diferente; esto podría ser un síntoma de un efecto secundario



### INFORMAR

inmediatamente a su equipo de atención médica



### MANEJAR

los efectos secundarios trabajando junto con su equipo de atención médica

**Su médico o enfermera podría cambiar la dosis de CABOMETRYX, suspender su administración temporalmente o interrumpir el tratamiento de manera permanente si usted presenta determinados efectos secundarios.** Tenga en cuenta que no todos los efectos secundarios se pueden controlar y algunos podrían requerir la discontinuación permanente del medicamento.

### Asegúrese de utilizar la Tarjeta de billetera



Puede imprimir esta Tarjeta en CABOMETRYX.com

Úsela para anotar los nombres y números de teléfono de su médico y enfermera, y los medicamentos que toma.

# Cómo tomar CABOMETRYX® (cabozantinib)

CABOMETRYX es una tableta que se toma una vez al día.  
Tómela según las indicaciones de su médico.

## QUÉ HACER



- Trague las tabletas de CABOMETRYX enteras
- Tome su dosis de CABOMETRYX a la misma hora todos los días o según indicaciones del médico
- Tome CABOMETRYX al menos una hora antes o al menos dos horas después de comer

## QUÉ NO HACER



- No tome CABOMETRYX con la comida
- No triture la tableta




- **No tome jugo de pomelo (toronja), no coma pomelo y no ingiera suplementos que contengan pomelo ni hierbas de San Juan ("St. John's wort")** durante el tratamiento con CABOMETRYX

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.



Si toma CABOMETRYX en combinación con OPDIVO® (nivolumab), consulte las **páginas 6 a 9**.



Si toma CABOMETRYX solo, consulte las **páginas 10 a 11**.

## ¿Qué sucede si olvido tomar mi dosis de CABOMETRYX?

Si su próxima dosis es en:

### MENOS DE 12 HORAS

- No intente compensar la dosis olvidada
- Tome la siguiente dosis en el horario habitual

### 12 HORAS O MÁS

- Hable con su médico o enfermera si se saltea una dosis

Este contenido no representa asesoramiento médico.  
Hable con su médico si tiene alguna pregunta.



**Cómo tomar CABOMETYX®**  
(cabozantinib) **en combinación**  
**con OPDIVO®** (nivolumab)

Continúe tomando CABOMETYX según las indicaciones de su médico y use la tabla a continuación para llevar un registro de sus citas para recibir infusiones.

Para saber cuando le administrarán las infusiones, prográmelas junto con su enfermera.



Número de infusión OPDIVO	Fecha/Hora
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	

6 Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

Use esta lista RIM para llevar un registro de sus síntomas y anotar sugerencias de su equipo de atención médica

Vea un ejemplo en la primera línea



**RECONOCER**

si se siente diferente; esto podría ser un síntoma de un efecto secundario



**INFORMAR**

inmediatamente a su equipo de atención médica



**MANEJAR**

los efectos secundarios trabajando junto con su equipo de atención médica

Síntoma/Fecha	Con quién hablé	Recomendaciones
Por ej. diarrea / 7/21	Por ej. Enfermera Smith	Use este espacio para anotar las recomendaciones de su enfermera o médico

Continúa en página 8

OPDIVO® y el logo relacionado es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb Company.





Número de infusión OPDIVO® (nivolumab) (continuación)	Fecha/Hora
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	

Si está tomando **CABOMETYX®** (cabozantinib) + **OPDIVO**, comuníquese con su médico o enfermera. Si tiene otras preguntas sobre **OPDIVO**, llame al **1-855-OPDIVO-1 (1-855-673-4861)** o visite **OPDIVO.com**.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.



**RECONOCER**

Síntoma/Fecha



**INFORMAR**

Con quién hablé



**MANEJAR**

Recomendaciones



## INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Qué es CABOMETRYX?

CABOMETRYX es un medicamento recetado que se usa para tratar:

- A personas con cáncer de riñón (carcinoma de células renales). CABOMETRYX se puede utilizar:
  - Como medicamento único para tratar a personas con carcinoma de células renales (CCR) que se ha propagado (CCR avanzado)
  - En combinación con nivolumab cuando el cáncer se ha propagado (CCR avanzado) y el paciente aún no ha recibido tratamiento para tratarlo
- A personas con cáncer de hígado (carcinoma de células hepáticas) que fueron previamente tratadas con el medicamento sorafenib.
- A adultos y niños de 12 años o más que tienen un tipo de cáncer de tiroides denominado cáncer de tiroides diferenciado (DTC) que se haya propagado (avanzado a nivel local o metastásico), y,
  - que haya progresado después de una terapia previa dirigida a VEGFR y
  - su DTC ya no pueda tratarse con yodo radioactivo o no esté en condiciones de recibir tratamiento con yodo radioactivo.

No se sabe si CABOMETRYX es seguro y efectivo en los niños menores de 12 años.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABOMETRYX?

**CABOMETRYX podría provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

**Sangrado (hemorragia).** CABOMETRYX puede causar sangrado grave que podría provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguna señal de sangrado durante el tratamiento con CABOMETRYX, incluidas las siguientes:

- tos con sangre o coágulos de sangre
- vómito de sangre o vómito con forma de granos de café

- heces rojas o negras (como brea)
- cualquier sangrado inusual o espeso
- sangrado menstrual más espeso de lo normal

**Un desgarró en el estómago o en la pared intestinal (perforación) o una conexión anormal entre dos partes del cuerpo (fístula).** Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene sensibilidad o dolor en el área del estómago (abdomen) que es grave o que no desaparece.

**Coágulos de sangre, derrames cerebrales, ataques al corazón y dolor en el pecho.** Si experimenta alguno de los siguientes problemas, obtenga ayuda de emergencia de inmediato:

- hinchazón o dolor en los brazos o las piernas
- falta de aire
- sensación de aturdimiento o desmayos
- más sudoración de lo normal
- adormecimiento o debilidad en el rostro, los brazos o las piernas, especialmente en un lado del cuerpo
- confusión repentina o dificultad para hablar o entender
- dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos
- dificultad repentina para caminar
- mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación
- fuerte dolor de cabeza repentino

**Presión arterial alta (hipertensión).** La hipertensión es común durante el tratamiento con CABOMETRYX y, a veces, puede ser grave. Su proveedor de atención médica le controlará la presión arterial antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX y regularmente durante el tratamiento con CABOMETRYX. Si es necesario, también podría recetarle medicamentos para tratar la presión arterial alta. Informe a su proveedor de atención médica si presenta dolores de cabeza intensos, hemorragias nasales, cansancio o confusión, cambios en la visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, latidos cardíacos irregulares o sangre en la orina.

**Diarrea.** La diarrea es común durante el tratamiento con CABOMETRYX y puede ser grave. Si es necesario, su proveedor de atención médica podría recetarle medicamentos para tratar la diarrea. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si, con frecuencia, sus heces son blandas o líquidas.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.

## INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

**Un problema de la piel llamado reacción cutánea mano-pie (HFSR, en inglés).** Las reacciones cutáneas mano-pie son comunes y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene erupciones, enrojecimiento, dolor, hinchazón o ampollas en las palmas de las manos o las plantas de los pies.

**Problemas hepáticos.** Pueden producirse problemas de hígado durante el tratamiento con CABOMETRYX. Cuando CABOMETRYX se toma en combinación con nivolumab, pueden ocurrir cambios graves en las pruebas de función hepática con más frecuencia que si toma CABOMETRYX solo. Su proveedor de atención médica le pedirá análisis de sangre para controlar el funcionamiento del hígado antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX y durante el tratamiento con CABOMETRYX. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla síntomas de problemas hepáticos como, por ejemplo, color amarillo de la piel o en el blanco de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura, sangrado o hematomas que aparecen más fácilmente de lo normal.

**Problemas con las glándulas adrenales.** Su proveedor de atención médica le controlará esta complicación. Puede recetarle una terapia de remplazo hormonal o medicamentos con corticoides, de ser necesario. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla cualquiera de los siguientes signos o síntomas: cansancio extremo, mareos o desmayos, debilidad, náuseas o vómitos.

**Proteína en la orina y posibles problemas renales.** Entre los síntomas podrían incluirse hinchazón en las manos, los brazos, las piernas o los pies. Su proveedor de atención médica le controlará este problema durante el tratamiento con CABOMETRYX.

**Problemas de mandíbula graves (osteonecrosis).** Su proveedor de atención médica debería revisarle la boca antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX y durante el mismo. Informe a su dentista que está tomando CABOMETRYX. Es importante que practique una buena higiene bucal durante el tratamiento con CABOMETRYX. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si desarrolla cualquier síntoma de problemas mandibulares, incluidos dolor mandibular, dolor de dientes o llagas en las encías.

**Problemas con la cicatrización de heridas.** En las personas que toman CABOMETRYX se han observado problemas para cicatrizar heridas. Informe a su proveedor de atención médica si piensa realizarse una cirugía antes o durante el tratamiento con CABOMETRYX.

- Debe dejar de tomar CABOMETRYX al menos 3 semanas antes de cualquier cirugía programada.
- Su proveedor de atención médica le indicará cuándo puede comenzar a tomar CABOMETRYX nuevamente luego de la cirugía.

**Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (RPLS).** Durante el tratamiento con CABOMETRYX, puede desarrollarse una afección llamada síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolores de cabeza, convulsiones, confusión, cambios en la visión o problemas para pensar.

**Cambio en la función tiroidea.** CABOMETRYX puede ocasionar cambios en la función tiroidea, incluidos cambios en los niveles de las hormonas tiroideas en sangre. Su proveedor de atención médica le pedirá análisis de sangre para controlar el funcionamiento de la tiroides antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX y durante el mismo.

**Disminución de los niveles de calcio en sangre (hipocalcemia).** CABOMETRYX puede ocasionarle una disminución de calcio en la sangre. Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre para verificar este problema y le proporcionará calcio, de ser necesario. **Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas:**

- rigidez o espasmos musculares
- convulsiones
- adormecimiento u hormigueo en los dedos de la mano o del pie, o alrededor de la boca
- aumento de peso repentino
- hinchazón en brazos, manos, piernas y tobillos

Su proveedor de atención médica puede cambiar la dosis de CABOMETRYX, suspender su administración temporariamente o interrumpir el tratamiento de manera permanente si usted presenta determinados efectos secundarios.

14 **Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.**



## INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (Continuación)

Entre los efectos secundarios más comunes de CABOMETRYX se incluyen:

- cansancio
- disminución del apetito
- náuseas y vómitos
- pérdida de peso
- estreñimiento

Los efectos secundarios más habituales de CABOMETRYX cuando se usa en combinación con nivolumab son los siguientes:

- cansancio
- llagas en la boca
- erupciones
- niveles bajos de la hormona tiroidea (hipotiroidismo)
- dolor en músculos, huesos y articulaciones
- disminución del apetito
- náuseas
- cambios en los sabores
- dolor en el área estomacal (abdomen)
- tos
- infección del tracto respiratorio superior

CABOMETRYX puede provocar problemas de fertilidad en hombres y mujeres que podrían afectar sus posibilidades de concebir. Hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca de la fertilidad. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de CABOMETRYX. Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug Administration) al 1-800-FDA-1088 o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

Si su proveedor de atención médica le receta CABOMETRYX junto con nivolumab, lea también la Guía de Medicamentos que viene con nivolumab.

**Antes de tomar CABOMETRYX**, informe a su proveedor de atención médica todas las afecciones médicas que tenga, incluida cualquiera de las siguientes:

- ha tenido un problema hepático que no sea cáncer de hígado
- tiene una historia de sangrado reciente, como por ejemplo tos o vómitos con sangre o heces negras (como brea)
- tiene una herida abierta o en proceso de cicatrización

- tiene presión arterial alta
- tiene bajos niveles de calcio en sangre (hipocalcemia)
- piensa realizarse una cirugía o un procedimiento dental, o se ha realizado una cirugía recientemente. Debe dejar de tomar CABOMETRYX al menos 3 semanas antes de cualquier cirugía programada
- está embarazada o piensa quedar embarazada, CABOMETRYX puede hacerle daño a su bebé
  - Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica revisará su estado antes de comenzar el tratamiento con CABOMETRYX.
  - Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y durante 4 meses después de la dosis final de CABOMETRYX.
  - Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que sean adecuados para usted.
  - Si queda embarazada o piensa que lo está, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
- si está amamantando o piensa hacerlo. No se sabe si CABOMETRYX pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento ni durante los 4 meses posteriores a la dosis final de CABOMETRYX.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos herbales recetados o de venta libre. CABOMETRYX y otros medicamentos determinados podrían afectarse mutuamente y provocar efectos secundarios.

### ¿Qué debo evitar mientras tomo CABOMETRYX?

**Evite** tomar jugo de pomelo, comer pomelo o tomar suplementos que contengan pomelo o hierba de San Juan durante el tratamiento con CABOMETRYX.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para pacientes en la Información completa de prescripción.



**Inscríbese y disfrute  
de todo lo que ofrece**



**BE CONNECTED**  
with CABOMETYX® (cabozantinib)

El programa de apoyo  
BE CONNECTED  
ofrece información  
y recursos para  
pacientes y  
cuidadores.

## **¡OBTENGA MÁS INFORMACIÓN E INSCRÍBASE AHORA!**

Escanee este código QR o visite  
[signup.CABOMETYX.com](https://signup.CABOMETYX.com)



Consulte la Información importante de seguridad en  
las páginas 12-17 y [haga clic aquí](#) para la Información para  
pacientes en la Información completa de prescripción.

**EXELIXIS®**

© 2021 Exelixis, Inc.  
Impreso en EE. UU.

 **CABOMETYX®**  
(cabozantinib) tablets

12/21 CA-1539-2